



راهنمای بیمار

راهنمای لیپوساکشن و BBL

آنچه پیش از لیپوساکشن یا BBL در استانبول به هر بیمار توضیح می‌دهم: اینکه برداشت چربی چه چیزهایی را می‌تواند و چه چیزهایی را نمی‌تواند تغییر دهد، اینکه VASER، MicroAire و Renuvion چگونه با هم کار می‌کنند، اینکه چگونه BBL ایمن انجام می‌شود، و اینکه دوره نقاهت شما واقعاً چگونه خواهد بود.



دکتر مصطفی آیدینول

جراح پلاستیک، ترمیمی و زیبایی، استانبول

عضو ISAPS

انجمن جراحان پلاستیک، ترمیمی و زیبایی ترکیه

مجوز گردشگری سلامت، وزارت بهداشت ترکیه

پیش از شروع

لیپوساکشن ابزار کانتورینگ است، نه عمل کاهش وزن. چربی‌های مقاومی را که با رژیم و ورزش از بین نمی‌روند برمی‌دارد، و نمی‌تواند پوست شل را بردارد. یک کلینیک اخلاق‌مدار گاهی توصیه می‌کند انجام نشود. این نشانه قضاوت خوب است، نه از دست دادن یک فروش.

BBL ابتدا لیپوساکشن است و سپس انتقال چربی. در بیشتر بیماران، لیپوساکشن بیشتر سیلوئت را تغییر می‌دهد و نحوه تزریق چربی تعیین می‌کند که عمل ایمن باشد یا نه.

این راهنما را با سرعت خودتان بخوانید. وقتی آماده بودید، چند عکس برایم بفرستید تا صادقانه بگویم آیا لیپوساکشن ابزار مناسبی برای بدن شما هست یا نه.

دکتر مصطفی آیدینول

در این راهنما

- 01 لیپوساکشن چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه کارهایی نمی‌تواند
- 02 VASER، MicroAire و Renuvion
- 03 کدام نواحی و کدام رویکرد
- 04 BBL: فرم‌دهی، با ایمنی
- 05 نتایج از مطب من
- 06 آیا شما کاندید مناسبی هستید؟
- 07 عمل
- 08 روزهای شما در استانبول
- 09 بعد از بازگشت با پرواز
- 10 ریسک‌ها و محدودیت‌های صادقانه
- 11 چگونه عکس‌های قبل و بعد را بخوانید
- 12 سؤال‌هایی که باید از هر جراح بپرسید
- 13 هزینه و نحوه دریافت برآورد
- 14 درباره دکتر آیدینول و قدم بعدی شما

لیپوساکشن چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه کارهایی نمی‌تواند

لیپوساکشن چربی زیر پوست را از طریق برش‌هایی چند میلی‌متری خارج می‌کند. سلول‌های چربی برداشته شده برنمی‌گردند، اما اگر افزایش وزن قابل‌توجهی داشته باشید، سلول‌های باقی‌مانده همچنان می‌توانند بزرگ شوند.

هر ناحیه را در سه لایه ارزیابی می‌کنم

پوست

اینکه پس از برداشتن چربی جمع می‌شود یا نه. آن را نیشگون بگیرید: اگر با رها کردن، چین باقی‌مانده ماندگار شد، باید پوست برداشته شود، نه فقط چربی.

چربی

چربی زیر پوست که لیپوساکشن روی آن انجام می‌شود: مقدار آن، محل قرارگیری‌اش، و اینکه آیا می‌توان آن را به جای دیگری منتقل کرد یا نه.

زیرین

چربی داخل شکم، اطراف اندام‌ها. لیپوساکشن به آن نمی‌رسد، بنابراین شکم سفت و گرد باقی می‌ماند.

لیپوساکشن چه کارهایی انجام نمی‌دهد

- عمل کاهش وزن نیست و جایگزین رژیم سالم و ورزش منظم نمی‌شود.
- سلولیت را درمان نمی‌کند و پوست شل و آویزان را برنمی‌دارد.
- به چربی داخل شکم نمی‌رسد.

پوست شل همراه با چربی؟

سفت‌کردن پوست

Endolift یا Renuvion به جمع شدن پوست کمی تا متوسط شل پس از لیپوساکشن کمک می‌کنند.

برداشتن پوست

وقتی پوست آویزان است، ابدومینوپلاستی، لیفت بازو یا لیفت ران آن را برمی‌دارد. پس از کاهش وزن زیاد، لیپوساکشن به‌تنهایی به‌ندرت پاسخ درست است.

مرز صادقانه: اگر نیشگون پوست چین ماندگار ایجاد کند، هیچ دستگاهی آن را جمع نمی‌کند. آن بافت باید با جراحی برداشته شود.
mustafaaydinol.com/fa/رنووین-یا-ابدومینوپلاستی/

Renuvion و VASER، MicroAire

نام تکنیک‌ها اغلب برای بازاریابی استفاده می‌شوند. بیشتر برنامه‌های من شامل دو تا چهار ناحیه و چند ابزار است که هرکدام یک کار را انجام می‌دهند.

Renuvion در پایان

پلازما هلیوم زیر پوست، از همان برش‌های کوچک، به جمع شدن پوست کمی تا متوسط شل کمک می‌کند. به ندرت آن را به تنهایی استفاده می‌کنم و نتیجه آن در شش ماه ارزیابی می‌شود.

MicroAire و VASER

VASER با اولتراسوند چربی را شل می‌کند، با کبودی کمتر و جمع شدن بهتر پوست؛ برای کارهای دقیق و پیکرتراشی شده انتخاب اول است. سپس MicroAire چربی را یکنواخت خارج می‌کند.

لیپو ۳۶۰ و HD liposuction چگونه؟

Lipo 360 فناوری جداگانه‌ای نیست؛ یک رویکرد است که شکم، پهلوها و پشت را با هم درمان می‌کند تا کمر از همه زوایا فرم بگیرد. لیپوساکشن با تعریف بالا (High definition) از نظر هنری دشوارترین و کم‌تحمل‌ترین نسبت به خطاست و یک جراح صادق گاهی توصیه می‌کند انجام نشود.

خود تکنیک به ندرت مشکل است. تصمیم‌گیری در مورد آن است که اهمیت دارد.

کدام نواحی و کدام رویکرد

اول تست نیشگون

بازوها و پشت

پوستی که به سرعت به حالت اولیه بازمی‌گردد، مشکل لیپوساکشن است. پوستی که هر جا می‌گذارید همان جا می‌ماند، به جای آن به لیفت نیاز دارد.

دور تا دور کمر

Lipo 360

شکم، پهلوها، پشتِ بالا و پایین و خط سوتین در یک برنامه، تا کمر از همه زوایا فرم بگیرد، نه فقط از روبه‌رو.

پرمتناقضی‌ترین‌ها

شکم و کمر

چربی شکم و کمر، معمولاً همراه با پهلوها. اگر پوست شل باشد یا عضلات از هم جدا شده باشند، ابدومینوپلاستی ابزار بهتری است.

چربی یا غده

سینه مردان

چربی با لیپوساکشن درمان می‌شود؛ اگر مشکل غده باشد، آن هم برداشته می‌شود. کار با تعریف بالا در جایی که آناتومی اجازه دهد ممکن است.

بی‌حسی موضعی

چانه و گردن

غیغب با بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی سبک درمان می‌شود، با حدود سه روز اقامت در استانبول.

داخل و خارج

ران‌ها و زانوها

لگن، ران‌های بیرونی و داخلی و زانوها. در پوست نازک و شل، لیپوساکشن می‌تواند افتادگی را بدتر کند و این را به شما می‌گوییم.

اغلب در همان عمل برنامه‌ریزی می‌شود

- BBL، با انتقال چربی خودتان به باسن
- ابدومینوپلاستی، وقتی پوست یا عضله نیاز به ترمیم دارد
- جراحی پستان، از جمله انتقال چربی به پستان‌ها
- Renuvion یا Endolift وقتی پوست برای سفت شدن به کمک نیاز دارد

ترکیب‌ها از قبل برنامه‌ریزی می‌شوند، به صورت یک عمل و یک دوره نقاهت. این تصمیم مشاوره است، نه انتخاب از روی منو.

BBL: فرم دهی، با ایمنی

چربی از کمر، پهلوها، پشت و اغلب شکم برداشته می‌شود، فرآوری می‌شود و در لایه‌های ظریف قرار داده می‌شود. نحوه قرار دادن آن بخشی است که در عکس قبل و بعد دیده نمی‌شود و همان بخشی است که باید تعیین کند به چه کسی اجازه می‌دهید شما را عمل کند.

حجم بر اساس بافت تعیین می‌شود

حجم را بافت شما تعیین می‌کند، نه یک عدد هدف. پرکردن بیش از حد شایع‌ترین دلیل از بین رفتن چربی منتقل شده است.

هدایت با سونوگرافی

سونوگرافی نشان می‌دهد کانولا کجاست. کانولاهای کند با قطر حداقل ۴ میلی‌متر هرگز رو به پایین زاویه داده نمی‌شوند، با فشار کم و حرکت مداوم.

فقط بالای عضله

تمام چربی در لایه زیر پوست، بالای عضله گلوئیتال تزریق می‌شود. هیچ‌کدام داخل یا زیر عضله تزریق نمی‌شود؛ جایی که وریدهایی قرار دارند که می‌توانند چربی را به ریه‌ها برسانند.

BBL برای چه کسانی مناسب است و برای چه کسانی نیست

- به چربی اهداکننده کافی، پوست مناسب روی باسن و وزن پایدار نیاز دارید.
- اگر خیلی لاغر باشید، به جای برداشت تهاجمی، این را می‌گوییم. در آن صورت ممکن است پروتز پاسخ بهتری باشد.
- اگر پوست باسن شل باشد، لیفت بهتر است. افزودن حجم زیر پوست شل، پوست را شل‌تر می‌کند.
- سیگار میزان ماندگاری چربی را کاهش می‌دهد، بنابراین پیش از BBL حتی مهم‌تر است.

چه مقدار از چربی باقی می‌ماند؟

بخش قابل‌توجهی در سه ماه اول جذب می‌شود: حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد چربی منتقل شده باقی می‌ماند و عدد دقیق از فردی به فرد دیگر متفاوت است، بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند آن را تضمین کند. فرمی که در سه تا شش ماه دارید همان فرم ماندگار است، به شرطی که وزن‌تان ثابت بماند؛ و برخی بیماران جلسه دوم را انتخاب می‌کنند.

نتایج از مطب من

این‌ها بیماران خود من هستند. برخی فقط برای عکس‌های بعد اجازه می‌دهند و زیر هرکدام ذکر می‌کنم.



سه بیمار

سه ناحیه متفاوت

لیپوساکشن با تعریف بالا برای شکم مردانه؛
لیپوساکشن همراه با اصلاح سینه مردانه؛ و
لیپوساکشن غبغب یک‌ونیم هفته پس از جراحی.
قبل در سمت چپ، بعد در سمت راست.



نتایج بیشتر




لیپوساکشن، VASER و Renuvion

بعد از جراحی. فقط عکس بعد، به درخواست بیمار.



لیپوساکشن و رنویون

بعد از جراحی. این بیمار فقط برای عکس بعد اجازه داده است.




لیپوساکشن ۳۶۰ و BBL

همراه با ابدومینوپلاستی و لیفت پستان، سن ۶۰ سال. قبل (چپ) و یک هفته بعد (راست).

داستان بیمار

ترمیم پس از چندین لیپوساکشن: VASER و Renuvion، همراه با پیوند چربی برای فرورفتگی‌ها.

برای تماشا اسکن کنید



نتایج بیشتر: /گالری-قبل-و-بعد/fa/mustafaaydinol.com

آیا شما کاندید مناسبی هستید؟

بهترین کاندیدها نزدیک به وزن پایدار هستند، پوست نسبتاً مناسبی دارند و چربی‌های مقاومی دارند که با رژیم و ورزش تغییر نکرده است.

بیشتر بیماران لیپوساکشن من در سه گروه قرار می‌گیرند

مردان

شکم، پهلوها و سینه، با کار تعریف بالا در جایی که پوست و آناتومی اجازه دهد.

فرم و انحنا

Lipo 360 همراه با BBL، برای فرم دادن کمر و انتقال حجم به جایی که می‌خواهید.

نواحی مقاوم

چربی‌ای که با وزن ثابت در نواحی مشخص می‌ماند: شکم، پهلوها، ران‌ها، بازوها یا چانه.

زمانی که می‌گوییم نه، یا هنوز نه

- می‌خواهید وزن کم کنید. لیپوساکشن ابزار کانتورینگ است و این را به شما می‌گویم.
- پوست شما به‌طور قابل‌توجهی شل است، مثلاً پس از کاهش وزن زیاد. لیپوساکشن به‌تنهایی آن را شل‌تر می‌کند.
- وزن شما هنوز در حال تغییر است، از جمله با داروهای کاهش وزن. معمولاً می‌خواهم ۴ تا ۶ ماه ثابت باشد.
- BMI شما ۳۰ یا بالاتر است. در این صورت معمولاً لیپوساکشن و BBL به تعویق می‌افتد، هرچند ممکن است برخی عمل‌های دیگر همچنان ممکن باشند.

عمل

مدت زمان عمل

حدود ۱ تا ۴ ساعت؛ BBL حدود ۳ تا ۴ ساعت

بییهوشی

بییهوشی عمومی؛ بی‌حسی موضعی برای نواحی کوچک مانند چانه

درن‌ها

معمولاً ظرف ۲ تا ۳ روز خارج می‌شوند، به‌ندرت دیرتر، بسته به مایعی که در ۲۴ ساعت جمع می‌کنند. شما هرگز با درن‌ها به خانه پرواز نمی‌کنید.

بیمارستان

یک شب؛ دو شب وقتی با ابدومینوپلاستی یا لیفت‌ها ترکیب شود

برداشتن حجم‌های بیش از حد در یک عمل، یکی از علل نتایج ضعیف است. ناحیه‌های اهداکننده را به همان دقتِ محل گیرنده برنامه‌ریزی می‌کنم، نه اینکه آن‌ها را صرفاً منبع مواد خام ببینم.

برش‌ها و گن فشاری

برش‌ها چند میلی‌متر طول دارند، در چین‌های پوستی و نواحی پوشیده با لباس زیر قرار می‌گیرند و طی ۱۲ ماه به‌طور قابل‌توجهی محو می‌شوند.

گن فشاری را شبانه‌روز می‌پوشید. پوشیدن در طول شب در تمام دوره الزامی می‌ماند، چون هنگام خواب امکان پایش بدن شما وجود ندارد.

روزهای شما در استانبول

۵ تا ۷ روز برای استانبول برنامه‌ریزی کنید، و پس از BBL حدود یک هفته.

روز ۰

جراحی

عمل شما، سپس یک شب بستری در بیمارستان. از همان عصر اول راه می‌روید.

روزهای ۱ تا ۴

هتل و ماساژ

ماساژ لنفاوی در استانبول شروع می‌شود و ۲ تا ۳ جلسه شامل می‌شود. درن‌ها معمولاً ظرف ۲ تا ۳ روز خارج می‌شوند، بسته به اینکه در ۲۴ ساعت چقدر مایع جمع می‌کنند.

بعد از BBL

راه رفتن، استراحت، کمی نشستن

نشستن کوتاه، هر بار تا حدود نیم ساعت، روی بالشی که وزن را روی پشت ران‌ها می‌اندازد. روی شکم یا پهلو بخوابید.

روزهای ۵ تا ۷

چک نهایی و پرواز

بیشتر بیماران پس از چک نهایی، بین روز پنجم تا هفتم به خانه پرواز می‌کنند. بعد از BBL، بالشتان را برای پرواز همراه ببرید.

برنامه‌ریز نقاهت

از برنامه‌ریز نقاهت در وبسایت من استفاده کنید تا تاریخ جراحی‌تان را به یک تقویم روزه‌روز برای سفر تبدیل کنید. /برنامه‌ریز-ریکاوری/fa/mustafaaydinol.com



بعد از بازگشت با پرواز

۱ تا ۲ هفته

کار پشت‌میزی از حدود یک هفته بعد از لیپوساکشن، و دو هفته بعد از BBL. اولین دوش گرفتن حدود روز دهم. رانندگی از حدود روز دهم، بعد از BBL روی بالش.

۳ تا ۶ هفته

گن فشاری حداقل ۶ هفته، بسیاری از بیماران تا ۸ هفته؛ از حدود هفته سوم پوشیدن در روز اختیاری می‌شود، اما شب‌ها همچنان الزامی است. ماساژ در خانه ادامه پیدا می‌کند، هفته‌ای ۲ تا ۳ بار. کار دیو سبک از حدود هفته سوم پس از لیپوساکشن تنها.

۶ تا ۸ هفته

تمرین کامل از حدود هفته ششم پس از لیپوساکشن تنها. بعد از BBL، کار دیو سبک از هفته ششم، نشستن معمولی از حدود هفته ششم و تمرین کامل از هفته هشتم.

۳ تا ۶ ماه

بیشتر ورم تا سه ماه فروکش می‌کند و نتیجه نهایی در سه تا شش ماه مشخص می‌شود. نتیجه‌ای که در ماه سوم می‌بینید، با کارهایی که در شش هفته اول انجام می‌دهید شکل می‌گیرد.

طبیعی در هفته‌های اول

- ورم و کبودی در نواحی درمان‌شده
- سفتی یا ناهمواری‌های اولیه: ماساژ مثل اتو کردن پوست است
- BBL که اکنون بزرگ‌تر از چیزی به نظر می‌رسد که در سه ماه خواهد بود

اگر متوجه موارد زیر شدید فوراً با تیم من تماس بگیرید

- ناحیه‌ای که سریع یا دردناک ورم می‌کند
- ساق پا که دردناک یا متورم است
- تنگی نفس یا درد قفسه سینه
- تب

ریسک‌ها و محدودیت‌های صادقانه

ریسک‌های لیپوساکشن شامل کبودی، ورم، ناهمواری کانتور، عدم تقارن، سروما، عفونت و لخته خون است. نتایج ضعیف معمولاً از تصمیم‌ها ناشی می‌شود: افراد غیرمتخصص، انتخاب نادرست کیس، امکانات نایمن و حجم‌های بیش از حد.

سروما

جمع شدن مایع زیر پوست. ناحیه‌ای که سریع یا دردناک ورم می‌کند باید دیده شود، نه اینکه منتظر بمانید تا خودبه‌خود خوب شود.

کانتور ناهموار

موج‌دار شدن، فرورفتگی یا عدم تقارن. برداشت یکنواخت، ماساژ و گن همگی مهم‌اند، و همچنین تعیین یک حد صادقانه برای حجم.

آمبولی چربی پس از BBL

رسیدن چربی به ریه‌ها، جدی‌ترین ریسک BBL. تزریق چربی فقط بالای عضله و تحت سونوگرافی از آن پیشگیری می‌کند؛ ریسک گزارش‌شده حدوداً شش برابر کاهش یافته است.

سوختگی با دستگاه‌ها

Renuvion و Endolift می‌توانند باعث سوختگی یا ناهمواری شوند. ریسک به تکنیک و تنظیمات مربوط است.

دو محدودیت صادقانه

لیپوساکشن شما را از افزایش وزن محافظت نمی‌کند. سلول‌های چربی برداشته‌شده برنمی‌گردند، اما سلول‌های باقی‌مانده می‌توانند بزرگ شوند.

چربی منتقل‌شده تا حدی جذب می‌شود، بنابراین BBL در سه تا شش ماه ارزیابی می‌شود و گاهی جلسه دوم لازم است.

چگونه عکس‌های قبل و بعد را بخوانید

تقریباً هر بدنی از زاویه بالا، با چرخاندن لگن، حبس نفس یا فیلتر، لاغرتر به نظر می‌رسد. مقایسه منصفانه تصویر کامل را نشان می‌دهد.

به چه چیزهایی توجه کنید

- ✓ در هر دو عکس، وضعیت بدن، فاصله و نور یکسان باشد.
- ✓ پوست، نه فقط خط دور بدن: موج‌دار شدن یا فرورفتگی در نور جانبی مشخص می‌شود.
- ✓ بعد از BBL، نماهای کنار و پشت، و اینکه آیا کمر و لگن به‌طور طبیعی به هم می‌رسند یا نه.
- ✓ ثبت زمان. در یک هفته، بدن هنوز متورم است و با گن‌نگه داشته می‌شود. درخواست کنید سه تا شش ماه را ببینید.

کیفیت تزریق از لیترهای ادعایی مهم‌تر است. در BBL، مهم‌ترین چیز بخشی است که عکس نمی‌تواند نشان دهد: چربی دقیقاً کجا قرار داده شده است.

سؤال‌هایی که باید از هر جراحی بپرسید

جراح از تکنیک مهم‌تر است، و ساختار پیرامون جراحی به اندازه خود جراحی اهمیت دارد.

1 آیا در جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی‌ی‌بورد/گواهی دارید و عضو کدام انجمن‌ها هستید؟

2 آیا لیپوساکشن ابزار مناسبی برای من است یا به برداشتن پوست نیاز دارم؟

3 برای نواحی من از کدام تکنیک استفاده می‌کنید و چرا؟

4 در BBL، چربی دقیقاً کجا تزریق می‌شود و آیا از سونوگرافی استفاده می‌کنید؟

5 چه حجمی را برنامه‌ریزی می‌کنید و چگونه تعیین می‌شود؟

6 چه مدت گن می‌پوشم و چند جلسه ماساژ شامل می‌شود؟

7 بعد از جراحی چه کسی در استانبول من را ویزیت می‌کند و وقتی به خانه برگشتم با چه کسی تماس بگیرم؟

8 دقیقاً چه چیزهایی در قیمت شامل می‌شود؟

علائم هشدار

- وعده یک عدد مشخص به لیتر یا سی‌سی
- تضمین درصد ماندگاری چربی
- نداشتن پاسخ روشن درباره اینکه چربی BBL کجا می‌رود
- پکیجی با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار

هزینه و نحوه دریافت برآورد

هزینه لیپوساکشن و BBL در استانبول به طور قابل توجهی کمتر از بریتانیا، آلمان یا اتحادیه اروپا به طور کلی است. در برابر پکیج‌های مشکوکاً ارزان محتاط باشید: هزینه‌هایی که کلینیک‌ها کم می‌کنند پوشش بیهوشی، زمان اتاق عمل و هدایت تصویربرداری است.

چه چیزهایی برآورد شما را شکل می‌دهد

- تعداد نواحی
- تکنیک‌های استفاده‌شده، مانند VASER و Renuvion
- اینکه انتقال چربی انجام می‌شود یا نه، مانند BBL
- عمل‌های ترکیبی و مدت بستری در بیمارستان

چگونه برآورد خود را دریافت کنید

1

عکس‌های خود را ارسال کنید

نمای روبه‌رو، کنار و پشت از نواحی‌ای که شما را اذیت می‌کند، در حالت ایستاده و ریلکس، همراه با قد و وزن شما.

2

تماس ویدیویی

درباره خواسته شما، آنچه بدن‌تان اجازه می‌دهد و سؤال‌هایتان صحبت می‌کنیم.

3

برآورد کتبی

برنامه و برآورد شما به صورت کتبی، شامل بیمارستان، بیهوشی، پیگیری در استانبول و جلسات ماساژ در آنجا.

درباره دکتر آیدینول

دوره تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی را در دانشگاه دجله (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷) به پایان رساندم و از سال ۲۰۲۰ مطب خود را در استانبول اداره می‌کنم. حوزه کار من جوان‌سازی صورت، رینوپلاستی، جراحی پستان و کانتورینگ بدن را پوشش می‌دهد، همیشه با یک قاعده: اقدام درست در زمان درست، یا یک «نه» صادقانه.

بیمارانی از آلمان، ایتالیا، بریتانیا، خاورمیانه و بسیاری کشورهای دیگر برای جراحی نزد من به استانبول سفر می‌کنند. من و تیمم کل سفر را حول عمل برنامه‌ریزی می‌کنیم.



انجمن جراحان پلاستیک، ترمیمی و زیبایی ترکیه

عضو ISAPS

عمل +۱۰,۰۰۰

مجوز گردشگری سلامت، وزارت بهداشت ترکیه

Rhinoplasty Society of Europe

گام بعدی شما

چند عکس در واتساپ ارسال کنید. بگویید چه چیزی بیش از همه شما را اذیت می‌کند تا صادقانه بگویم چه چیزی را توصیه می‌کنم.

واتساپ +90 544 772 07 72

ایمیل info@mustafaaydinol.com

کلینیک Yeşilçimen Sokak No:12, Polat Tower Residence K:2 D:20, Fulya, Şişli, İstanbul



لیپوساکشن



نقاقت خود را برنامه‌ریزی کنید



در واتساپ پیام بدهید

این راهنما اطلاعات عمومی است و جایگزین مشاوره پزشکی شخصی نیست. برنامه شما، عمل و دوره نقاهت‌تان به معاینه خودتان بستگی دارد.